

onze commissures transversales latéro-ventrales. Les rameaux latéro-ventraux mésothoracique, métathoracique et du premier segment abdominal sont unis chacun à chacun, près de leur insertion, par un filet trachéen arqué. Les filets trachéens des deux derniers segments du corps prennent naissance sur le tronc anastomotique transversal qui réunit les troncs latéraux au niveau du onzième segment.

Les particularités les plus importantes de l'appareil trachéen de la larve des *Bembex* sont le nombre des stigmates, le faible calibre des branches stigmatiques et le nombre des anastomoses latéro-ventrales.

DESCRIPTION DE DEUX ESPÈCES NOUVELLES DE BRACONIDES,

PAR M. LE RÉV. T. A. MARSHALL.

BRACON MELANOTHRIX Marsh. ♂.

Noir, luisant, lisse, nullement ponctué: tout le corps poilu, notamment la tête et le thorax. Tête hérissée de poils noirs assez longs. Antennes très épaisses (mutilées). Scutellum bordé de chaque côté d'une ligne jaunâtre. Ailes allongées, hyalines; deuxième cellule cubitale moins longue que la troisième: stigma et nervures noirâtres. Pattes épaisses, noires, finement poilues. Abdomen entièrement lisse: premier segment en ovale rebordé, sa plaque médiane très lisse, légèrement convexe, tronquée par derrière: côtés membraneux jaunâtres: deuxième plus court que le troisième, élevé au milieu et portant de chaque côté une excavation profonde; tous les segments lisses et luisants, parsemés de poils fins. Long., 2 millimètres.

Appartient à la grande section du genre qui se distingue par l'abdomen tout à fait lisse. Voisin des *B. obscurator* Nees, *B. anthracinus* Nees, etc.: mais distinct par sa remarquable pilosité.

Patrie: France; recueilli à Anhay-sur-Marne (Marne) par M. L. Seurat, dans le capitule de *Centaurea jacea*.

MICROPLITIS TUNETENSIS Marsh. ♂ ♀.

Noir, pointillé, mat, seulement l'abdomen luisant. Tête densément pointillée. Antennes de la ♀ pas plus longues que la tête et le thorax. Metanotum ruguleux, finement réticulé, sans carène médiane. Ailes à peine nuancées d'une teinte fumense, avec une large bande hyaline et transverse dans le milieu: nervures et stigma noirs, celui-ci blanc dans son tiers basal; côte testacée vers la base: nervure externe de la deuxième cellule cubitale faiblement tracée. Éperons des tibias de derrière blanchâtres, un peu longs pour un *Microplitis*, mais plus courts que chez les *Microgaster*, étant moins longs que la moitié du métatarse. Pattes noires: trochanters, genoux, extrémité des tibias et base des tarsi testacés. Abdomen très lisse, même sur le premier segment, qui est convexe, aussi long que large, et arrondi au

sommet. Tarière à peine saillante. Je n'ai sous les yeux que trois exemplaires : deux ♀ et un ♂ ; les sexes sont parfaitement semblables, seulement le ♂ a les antennes un peu plus longues. Les cocons sont blancs. Larves parasites internes de Chenilles. Long., 2 millimètres.

Patrie : Tunisie, Aïn-Draham : juin 1899, L. Seurat.


Collection du Muséum.

*SUR LA FEMELLE PROBABLE DE L'ANOMMA NIGRICANS* ILL. (HYMÉNOPTÈRE),

PAR M. ERNEST ANDRÉ.

(LABORATOIRE DE M. LE PROFESSEUR BOUVIER.)

Les femelles des Fourmis de la famille des Dorylides sont encore peu connues et extrêmement rares dans les collections. Il n'en a été décrit jusqu'à ce jour qu'un très petit nombre d'espèces, dont les exemplaires sont uniques ou fort clairsemés. Tandis que les ouvrières et les mâles de ces Fourmis se rencontrent facilement et en nombre souvent considérable, les femelles, au contraire, toujours réduites à quelques individus, mènent une vie beaucoup plus cachée et semblent fort difficiles à découvrir. Ajoutons aussi que leur capture, au milieu de l'armée innombrable des ouvrières, n'est pas volontiers tentée par les voyageurs, surtout quand il s'agit des *Eciton* ou des *Anomma* dont les crocs acérés infligent à l'imprudent des blessures multipliées et fort désagréables.



*Anomma nigricans* Illiger ♀.

forme typique du genre, c'est-à-dire à l'*A. nigricans* Ill. (= *Burmeisteri* Shuck.).

Pour justifier mon opinion, je dirai que cette femelle se distingue de celles